

SINTOMI GENERALI DA STREPTO- E STAFILO-COCCHI

(da Trattato di Medicina Interna dell'Istituto Biochimico Italiano, 1931, Società Editrice Libreria)

Malessere generale, spossatezza, senso di freddo, con pallore, cianosi, orripilazione, tachicardia, ipotensione, nausea, vomito, cefalea

Brividi, febbre (in genere di tipo remittente)

Polso piccolo e frequente, molle, spesso aritmico; ipotensione

Agitazione, cefalea, confusione, delirio, convulsioni, meningismo

Stato depressivo, stupor, adinamia (nei casi più gravi)

Lingua secca, fuliginosa, anoressia, nausea, vomito, diarrea

Tachipnea, dispnea; oliguria, albuminuria

Orticaria ed esantemi, porpora, sub-ittero o ittero, epato-splenomegalia

Manifestazioni articolari

Pustole cutanee, esantemi pustolosi, pemfigoidi

SETTICEMIE DA STREPTOCOCCHI

Predominio dei sintomi generali, rispetto a quelli localizzati

INIZIO: brusco con brividi intensi, ma brevi; febbre alta, cute arida, cefalea, agitazione e, soprattutto, prostrazione intensa; talora vomito e diarrea

PERIODO DI STATO: assoluto predominio dei sintomi generali, con delirio (tranquillo o agitato), lingua arida, facies pallida, rigida, polso piccolo e frequente, dispnea intensa

FEBBRE: continua o fortemente remittente, con abbondante sudorazione

Meteorismo; epato-splenomegalia; oliguria e albuminuria

Esantema scarlattiniforme, erisipelatoso, emorragico (soprattutto)-> porpora

Manifestazioni vasali (flebiti), articolari (artriti), endocardiche

Broncopolmonite, nefrite acuta, ittero (manifestazioni locali)

SETTICEMIE DA STAFILOCOCCI

95% dei casi: metastasi suppurate (35% nel caso di streptococchi)

Spesso visibile la porta di entrata: foruncoli, favi, patercelli, ascessi sottocutanei, pustole, lesioni mucose digestive (gengive, tonsille, ascessi dentari, appendice, trachea, bronchi, vie urinarie e genitali)-> streptococchi: spesso non visibile la porta di entrata

Tanto più facili, quanto più scarse e compromesse sono le condizioni organiche

In generale hanno un andamento acutissimo o acuto

PERIODO PRODROMICO: malessere, astenia, cefalea e nausea

PERIODO DI INVASIONE: brividi violenti, iperpiressia e vomito

PERIODO DI STATO: brividi alternati a febbre, con eccitazione e delirio, angoscia di morte imminente, insonnia, lingua arida e sete anche intensa, midriasi, dispnea, meteorismo, vomito, gorgoglio ileo-cecale, oliguria, polso piccolo e frequente

ANALOGIA SINTOMATOLOGICA CON IL TIFO

**PREVALENTI, RISPETTO AI SINTOMI GENERALI, SONO QUELLI DI
INFIAMMAZIONE LOCALIZZATA
(nei diversi organi e tessuti)**

**LA FEBBRE E' MOLTO PIU' REMITTENTE DELLA STREPTOCOCCICA
(con frequenti poussés)**

RENI: nefrite acuta, con dolori lombari e piuria

OSSA: focolai osteomielitici

CUTE: esantema pustoloso, porpora, ascessi e suppurazioni